

**ANALYSAR INFEKSJONSIMMUNOLOGI/VIRUSKVANTITERING**

Analyse / Undersøking	Prøvetaking / Sending	Svartid*	Seksjon Molde/Ålesund
Anti DNase B	Serum	2-7 dagar	M
AST	Serum	2-7 dagar	M
Borrelia IgG, IgM	Serum	2-5 dagar	M
Borrelia Immunoblot	Serum	3-5 dagar	M
Borrelia, Neuro-	Serum + Sp.v.	2-4 dagar	M
Cytomegalovirus IgG, IgM	Serum	2-4 dagar	M
Cytomegalovirus kvantitering	Gelrør m/EDTA**	1 veke	M
CXCL13	Spinalvæske	2-4 dagar	M
Denguefebertest	EDTA-blod	1 dag	M/Å
Epstein-Barr virus IgG, IgM, EBNA	Serum	2-4 dagar	M
Helicobacter pylori IgG	Serum	2-5 dagar	Å
Hepatitt A, B, C screening	Serum	2-4 dagar	M / Å
Hepatitt B oppfølging	Serum og Gelrør m/EDTA**	1-2 veker	M
Hepatitt C oppfølging	Serum og Gelrør m/EDTA**	1 veke	M

Herpes simplex IgG/ IgM	Serum	2-7 dagar	M
HIV screening	Serum	2-4 dagar	M / Å
Malariatest	EDTA-blod	1 dag	M / Å
Malaria blodutstryk ***	EDTA-blod	1 dag	M / Å
Morbilli IgG, IgM (Meslinger)	Serum	2-5 dagar	M
Parotittvirus IgG, IgM	Serum	2-5 dagar	M
Parvovirus IgG, IgM	Serum	2-5 dagar	M
Puumulavirus (Hantavirus)	Serum	2-3 dagar	M
Rubella IgG, IgM	Serum	2-5 dagar	M
Rubella IgG-sv.skap	Serum	2-5 dagar	M / Å
Syfilis	Serum	2-4 dagar	M / Å
Toxoplasma antistoff	Serum	2-4 dagar	M / Å
Varicella Zoster IgG, IgM	Serum	2-5 dagar	M

\*Oppgitt forventa svartid blir rekna frå den dagen vi mottar prøvene. Det må påreknast noko lenger svartid i samband med feriar og helge - og høgtidsdagar. Ved behov for ø-hjelp, ta kontakt med laboratoriet. Prøva kan ofte analyserast same dag.

\*\*PPT-rør må sentrifugerast før transport, og innan 6 timer etter prøvetaking.

\*\*\* Malaria blodutstryk: Blodprøve må takast ved medisinsk biokjemi på eit av sjukehusa, da preparatet må lagast med ferskt blod.

Ein del analyser blir utført ved berre ein av seksjonane. Prøver kan sendast direkte til den aktuelle seksjonen. Seksjonane vidare sender prøver om det er behov for det.