

Gjelder rekvirenter som sender prøver på genital klamydia til Molde:

Vedrørende undersøkelse for *Neisseria gonorrhoeae*.

Fra og med 6.mai 2013 vil alle prøver som undersøkes for genital klamydia også undersøkes for gonoré.

Dersom man på enkelte prøver vil reservere seg fra undersøkelse for gonoré, så ber vi om at det oppgis under kliniske opplysninger.

På grunn av svært høy forekomst av antibiotikaresistens blant *Neisseria gonorrhoeae*, er det ønskelig med en mer aggressiv diagnostisk tilnærming for å holde prevalensen av gonoré på det lave nivået vi har i Norge i dag.

Analysen for klamydia og gonoré er en kombinert analyse, slik at prøvetakningen forblir uendret; urinprøve for menn, urinprøve eller vaginalprøve for kvinner, tatt på klamydia-transportmedium.

Mycoplasma genitalium kan også undersøkes fra samme prøve, men dette er en separat analyse. *Mycoplasma genitalium* vil bare undersøkes på prøver fra symptomatiske pasienter og asymptomatiske dersom partner har påvist infeksjon eller forut for abort.

Ved positiv primær undersøkelse for gonoré vil laboratoriet be om ny prøve for resistenstesting. Det er da viktig at man tar en penselprøve fra urethra/cervix/vagina og ikke urinprøve. Prøve fra hals og rectum kan også være aktuelt. Prøven tas på vanlig kullpensel eller eSwab.

Den primære undersøkelsen er en svært sensitiv genteknologisk undersøkelse (PCR), og det er ikke alltid man klarer å dyrke frem bakterien selv om den påvises i primærundersøkelsen.

Har man klinisk mistanke om gonoré bør man ta prøve både til PCR og dyrkning med en gang.

Vennlig hilsen



Einar Vik
Medisinsk rådgjevar
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
E-mail: enar.vik@helse-mr.no



Marie Aslaksen Røed
Fagkoordinator Genteknologi
Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Seksjon Molde
E-mail: marie.aslaksen.roed@helse-mr.no